

HÉRISSONS SAUVAGES (en liberté)

Un conseil à garder à l'esprit lorsque le public parle d'un hérisson trouvé dans la nature

1. **Aucun poids spécifique ne garantira la survie.**
2. **Ceux qui hibernent avec moins de 450 g ne survivront probablement pas** (même si certains le font parfois).
3. Un poids plus important peut augmenter les chances de survie, mais il n'y a aucune preuve de cela.
4. Ils peuvent, et beaucoup le font, survivre en hiver pesant moins de 600 g (par exemple 52% des juvéniles).
5. **Ils devraient normalement être pris en charge avec un poids inférieur à 450 g en octobre – février** (en fonction des conditions météorologiques, de la fréquence des stations d'alimentation, etc.).
6. **Prendre en charge un hérisson qui a plus de 500 g en se basant uniquement sur le poids est inutile à tout moment de l'année.** (Le poids est sans importance quand il est dehors pendant la journée sans raison ou il semble malade ou blessé).
7. **Prendre en charge un hérisson qui a un poids supérieur à 600 g en se basant uniquement sur le poids est contre-productif et fortement déconseillé.** Apporter un hérisson en bonne santé à la rescousse est stressant pour le hérisson, et la charge parasitaire est amplifiée, provoquant de graves problèmes pour l'animal. En outre, le fait d'être à proximité d'autres hérissons avec des conditions potentiellement contagieuses comporte des risques.
8. Si un hérisson est à l'extérieur pendant la journée ou il a l'air malade ou blessé de quelque manière que ce soit, il faut le prendre en charge indépendamment de son poids. *(NOTE : Ce conseil concerne les portées tardives (hérissons d'automne) - il existe une exception à la règle « Hérisson à l'extérieur en journée » s'il s'agit d'un hérisson femelle qui construit son nid pendant la saison de reproduction ou qui « se repose en dehors du nid » (*). Ce sont des hérissons adultes et ils se déplacent avec un but précis et pour des périodes de courte durée à la fois).*

Une fois qu'un hérisson a été pris en charge pour passer l'hivernation, ou qu'il est en soins jusqu'au moment du relâcher, le conseil est légèrement différent, car il perdra du poids après sa remise en liberté. Par conséquent, le conseil ci-dessous s'adresse aux Capacitaires pour les hérissons qui ont **déjà été pris en charge** :

ÉLEVÉS EN CAPTIVITÉ ou JUVÉNILES (animaux en rééducation)

Conseils aux hérissons en soins

1. Les hérissons en captivité grossissent rapidement par rapport à leurs homologues sauvages du même âge (atteignant parfois le double du poids naturel pour cet âge).
2. Ils perdent vite cet excès de poids après le relâcher et perdent donc du poids plus rapidement que les hérissons sauvages.
3. **Ils ne devraient pas être libérés à des poids inférieurs à 500 g en automne (600 g très tard en automne / début d'hiver).**
4. **Un poids plus important (par exemple plus de 600 g) peut améliorer la survie, mais il n'y a aucune preuve de cela.**
5. L'excès de poids n'est probablement pas bénéfique et peut être nocif. Les hérissons pris en charge au *Vale Wildlife Hospital* sont mis au régime quand ils atteignent 1 kg lorsqu'ils sont en période d'hibernation. Les poids optimaux pour les hérissons varient énormément d'un individu à l'autre. Le poids optimal pour un hérisson pourrait être par exemple 800 g, tandis qu'un autre pourrait bien se situer dans sa fourchette de poids normal à 1100 g. Le *Vale Wildlife Hospital* a constaté que le fait de garder des hérissons hibernants avec un poids inférieur à 1 kg a limité le nombre de problèmes en développement dus au surpoids en captivité.
6. **Aucun poids spécifique ne garantira la survie.**

(*) *Souvent les femelles ayant une portée, prennent des bains de soleil à l'extérieur, d'une durée de 30 à 60 minutes à proximité du nid, pour se réchauffer au soleil.*

Alors que les hérissons se retirent habituellement dans un « nid d'été » couvert pendant la journée en saison active, ils peuvent occasionnellement (REEVE, 1994) ou même souvent (MORRIS, 1994) se reposer à l'extérieur, près de leur nid ou dans un lieu de végétation abondante, en particulier par temps chaud. (CORBET & HARRIS, 1991 ; MORRIS, 1987 ; MORRIS, 1997) [Extrait de mon mémoire pour l'obtention du Certificat de Capacité].